Description de deux *Aegeriidae* nouvelles [Lep.]

par F. Le Cerf.

Aschistophleps haematochrodes, n. sp. (fig. 1). — Ailes supérieures transparentes, avec la côte, les bords externe et interne, la nervure médiane, une très large tache discocellulaire et les nervures divisant le champ extracellulaire noir velouté. De fines lignes d'écailles de même couleur divisent longitudinalement les espaces internervuraux : 3-4, 4-5, 5-6 et 6-7. On voit quelques écailles rouges à la base et à la partie supérieure externe de la tache discocellulaire.

Fig. 1.
Aschistophleps haematochrodes Le Cerf.

Ailes inférieures transparentes ayant également une tache discocellulaire très développée et prolongée entre les nervures 2 et 3, le bord externe et les nervures (excepté 1a 1b) du même noir qu'aux supérieures. Le bord interne, les nervures 1a 1b et l'angle anal rouge sang.

Tout ce qui est noir en dessus est en dessous rouge sang, à l'exception du bord externe et des nervures qui, aux supérieures, divisent le champ externe.

Frange des quatre ailes noire de part et d'autre, sauf au bord interne et à la base des inférieures qui sont rouge sang.

Tête ronde, noire, à front bombé noir violacé; antennes concolores avec quelques écailles rouges avant l'extrémité. Palpes blanc pur à la base, avec le troisième article noir.

Corselet noir à collier et ptérygodes bordés de rouge; tache latéro-pectorale blanc pur ainsi que les hanches des trois paires de pattes.



Fig. 2.
Sesia (?) Donckieri Le Cerf.

Fémurs et tibias antérieurs noirs, ceux-ci mêlés de rouge extérieurement; pattes médianes absentes, celles de la troisième paire sont à fémurs courts, nus, et à tibias très longs, noirs de la base à la première paire d'éperons puis, un peu avant l'extrémité, du côté externe et en dessus; le reste est mêlé d'écailles blanches et de longs poils rouges sang disposés dans un sens vertical sur les arêtes supérieures et inférieures.

Tarses noirs annelés de rouge.

L'abdomen qui manque dans notre spécimen mais dont le collecteur nous fait tenir un bon dessin et une courte description, est noir avec tous les segments bordés postérieurement de rouge sang, cette bordure croissant de largeur des premiers au dernier.

Type : 1 ♀ ; envergure 15 mill. 5. — Tonkin : Su-Yut, sur la rivière Noire, VII 1911.

Sesia (?) **Donckieri**, n. sp. (fig. 2). — Ailes supérieures transparentes, écaillées à la base, la côte et l'espace terminal de brun gris terne avec les trois taches hyalines ordinaires très développées ; l'ultra-cellulaire un peu courbe, divisée en cinq parties subégales.

Tache discocellulaire grosse, noir mat ; quelques écailles jaunes se voient à l'apex, à la base de la cellule, le long de la sous-costale et à l'extrémité de l'infra-cellulaire, sous la tache noire discocellulaire.

Les ailes inférieures sont transparentes, sans tache discocellulaire, la nervure de ce nom étant si brève dans sa partie supérieure que 5 paraît émerger de 6. Le bord de l'aile, la frange et les nervures sont brun gris, l'apex est jaune, coupé du côté interne par une tache noire en arc de cercle, disposition qui paraît rare chez les *Aegeriidae*.

Dessous des quatre ailes pareil au dessus mais un peu plus clair et avec plus de jaune.

Tête, palpes, corselet et pattes brun gris terne. Abdomen de cette couleur en dessous, noirâtre en dessus avec le deuxième segment largement bordé de blanc jaunâtre et le sixième de gris clair.

Le dernier segment est long et porte une brosse très particulière, composée de grosses écailles en spatule à long pédoncule.

Les pattes antérieures et médianes sont courtes, assez grêles, avec quelques écailles claires à l'extrémité des tibias (les postérieures manquent). Antennes fusiformes, noirâtres à pointe brune.

Type : 1 ♀, envergure 32 mill. — Madagascar : baie d'Antongil (1911).

Nota. — Cette espèce n'est certainement pas à sa place dans le genre *Sesia* (auct.), dont l'écartent la nervulation de ses ailes inférieures, ses palpes longs à troisième article porrigé, son front presque plat comme celui des *Paranthrene*, ses pattes courtes, sa brosse anale si curieuse, etc., mais nous attendrons d'en connaître le mâle pour l'ériger, si cela paraît nécessaire, en genre spécial.

Nous sommes heureux de dédier cette Sésie à M. H. Donckier de Donceel qui nous l'a gracieusement offerte, ainsi que la précédente.